

**HyQvia**

*Humant normalt immunglobulin (10%)*

*Rekombinant humant hyaluronidas*

# Infektionsdagbok

---

Tag med till mottagningen

Namn .....

Personnummer .....

År .....

Infektionsdagboken lämnas ut av sjukvårdspersonal.

Läs bipacksedeln noggrant.

# Information

## Bäste patient!

Du har fått den här dagboken för att hjälpa dig dokumentera dina infusioner och göra det lättare för din läkare att följa din behandling. Logga därför detaljerna om dina infusioner efter varje behandling. Prata med din läkare eller sjuksköterska om du behöver fler dagböcker.

## Kontaktpersoner

LÄKARE \_\_\_\_\_

SJUKSKÖTERSKA \_\_\_\_\_

VID INFEKTION KONTAKTAS I FÖRSTA HAND \_\_\_\_\_

## Diagnos/Läkemedel

DIAGNOS \_\_\_\_\_ DIAGNOSKOD \_\_\_\_\_

IMMUNGLOBULINBEHANDLING

DOS \_\_\_\_\_ g                      DOSINTERVALL \_\_\_\_\_

DOS \_\_\_\_\_ ml                      DOS/INFUSIONSSTÄLLE \_\_\_\_\_ ml

ANDRA LÄKEMEDEL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LÄKEMEDELSÖVERKÄNSLIGHET \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ÖVRIGT \_\_\_\_\_

## Mottagningsbesök

DATUM / KL.	DOKTOR / SJUKSKÖTERSKA	DATUM / KL.	DOKTOR / SJUKSKÖTERSKA
ANVISNINGAR SOM HAR ÖVERENSKOMMITS VID MOTTAGNINGSBESÖKET			



## Antibiotikabehandling

PREPARAT	INSATT DATUM	ANTAL DAGAR

## Sjukskrivning från arbete/skola

FRÅN OCH MED	TILL OCH MED	FRÅN OCH MED	TILL OCH MED

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		



DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR / ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
<b>BATCH NR</b>	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

DATUM	DOS	EV. BIVERKNINGAR/ ÖVRIGT
		Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar under eller efter infusion.
BATCH NR	[ Dra av etiketten från <b>HyQvia</b> -flaskan och fäst den här ]	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		

**Denna infektionsdagbok är framtagen av en arbetsgrupp inom SLIPI (Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist), med stöd från Takeda. I arbetsgruppen finns läkare verksamma inom olika specialiteter och med särskilt intresse för immunbristsjukdomar.**

**HyQvia** (humant normalt immunglobulin), 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning för subkutan användning. **Vad HyQvia är och vad det används för:** HyQvia består av en flaska med immunglobulin och en flaska med hyaluronidas. Immunglobuliner kallas också antikroppar och finns i blodet hos friska människor. Hyaluronidas hjälper immunglobulin att komma ut i blodet. HyQvia används hos patienter med svagt immunsystem, som inte har tillräckligt med antikroppar i blodet och ofta drabbas av infektioner, för att höja låga immunglobulinnivåer till normala nivåer (substitutionsterapi). **Använd inte HyQvia:** Om du är allergisk mot immunglobuliner, hyaluronidas, rekombinant hyaluronidas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har antikroppar mot immunglobulin A (IgA) i blodet (brist på IgA). Infundera inte i ett blodkärl (intravenöst). **Varningar och försiktighet:** Allergiska reaktioner som plötsligt blodtrycksfall eller anafylaktisk chock är sällsynta, men kan ibland förekomma även om du inte har haft problem vid liknande behandlingar tidigare. Tecken eller symtom på dessa sällsynta allergiska reaktioner omfattar: berusningskänsla, yrsel, svimningskänsla; hudutslag och klåda, svullnad i munnen eller i halsen, svårighet att andas, väsande andning; onormal hjärtrytm, bröstsmärtor, blå läppar, fingrar eller tår samt suddig syn. Om du märker något av dessa tecken under infusionerna ska du omedelbart berätta det för läkaren eller sjuksköterskan. Du ska alltid övervakas under infusionerna och i minst 20 minuter därefter, i vissa fall längre tid. Vid behandling i hemmet måste du och din tillsynsperson vara uppmärksamma på tidiga tecken på biverkningar under infusionen. Vid biverkning, avbryt infusionen omedelbart och kontakta läkare. Vid allvarlig biverkning, sök akut hjälp. Det är mycket viktigt att infundera läkemedlet i rätt hastighet (läkare eller sjuksköterska ger dig lämpliga råd om det). Infundera inte HyQvia i eller runt ett infekterat eller rött och svullet område på huden. Innan du tar ett blodprov eller vaccinerar dig, tala med läkare om din behandling med HyQvia. Notera följande information i behandlings-dagboken efter varje infusion HyQvia: datum, tillverknings-satsnummer, injicerad volym, infusions-hastighet, och infusionsställe(n). Du kan uppleva biverkningar (till exempel yrsel eller illamående) under behandling med HyQvia som kan påverka körförmågan och förmågan att använda maskiner. Om det händer, vänta tills reaktionerna har gått över. HyQvia ska endast användas av gravida eller ammande kvinnor efter diskussion med läkaren. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda HyQvia.** Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 10/2022.

**Kontakt:** Takeda Pharma AB, [infosweden@takeda.com](mailto:infosweden@takeda.com), tel. 08-731 28 00, [www.takeda.se](http://www.takeda.se).



Takeda Pharma AB  
Telefon: 08-731 28 00  
E-post: [infosweden@takeda.com](mailto:infosweden@takeda.com)  
[www.takeda.se](http://www.takeda.se)

C-ANPROM/SE/HYQ/0007 01/2023