



Till dig som behandlas med ALUNBRIG® (brigatinib)



ALUNBRIG®
BRIGATINIB

En broschyr till dig som har blivit ordinerad ALUNBRIG

Nu när du har fått Alunbrig förskrivet av din läkare har du kanske frågor och funderingar om din behandling.

Den här broschyren är tänkt som ett stöd och för att ge dig information gällande din behandling, men också för att vara till stöd vid dina samtal med din läkare och sjuksköterska. I broschyren hittar du tips och råd för hur du kan vara delaktig i din behandlingsplan.

Vänd dig alltid till din läkare eller sjuksköterska om du har ytterligare frågor eller vill ha mer information.

Om lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) står för majoriteten (80%) av alla lungcancerfall. De vanligaste formerna av NSCLC är adenokarcinom, skivepitelcancer och storcellskarcinom.

För att undersöka vilken form av lungcancer du har och för att få information om vilket läkemedel som canceren kan vara mottaglig för tas ett vävnadsprov (biopsi) från tumören.

Den här broschyren riktar sig till dig som har blivit ordinerad ett läkemedel som heter Alunbrig och därmed har du vid testning visats ha en ALK-positiv lungcancer.

Vad är ALUNBRIG?

Alunbrig är en behandling för vuxna patienter som har en ALK-positiv, avancerad NSCLC. Alunbrig innehåller den verksamma substansen brigatinib.

Vad innebär det att ha en ALK-positiv lungcancer?

Att ha en ALK-positiv lungcancer innebär att man vid testning har hittat en förändring i en specifik gen kallad anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Hos patienter med en förändring i ALK-genen, produceras ett protein som stimulerar tillväxt av cancerceller.

Alunbrig är ett riktat läkemedel som blockerar aktiviteten hos detta protein och kan minska tillväxten och spridningen av lungcancer.

Kan man behöva en ny behandling?

Trots att man får en riktad behandling kan cancerceller efter en tid börja sprida sig. Det kallas progression. Progression är när tumören börjar växa, sprider sig till andra delar av kroppen (kallas för att tumören metastaserar) eller när nya tumörer utvecklas under pågående behandling, då kan din läkare ordinera en ny behandling.

Ibland kan vissa patienter uppleva biverkningar av ett visst läkemedel, även då kan din läkare ordinera en ny behandling.

Att ta ALUNBRIG

Följ din läkares direktiv gällande hur du ska ta Alunbrig. Här kommer ytterligare rekommendationer för att du ska få ut det mesta av din behandling:

- Alunbrig tas som tablett **en gång per dag**.
- Din läkare kommer att ordinera att du startar din behandling med en 90 mg dos de första 7 dagarna. Om du tolererar dosen bra kommer din läkare att höja din dos till 180 mg efter de första 7 dagarna.
- Alunbrig tablett finns i tre olika styrkor: 180 mg, 90 mg och 30 mg.
- **Ta Alunbrig exakt så som din läkare har rekommenderat.** Ändra inte dosen eller sluta ta Alunbrig om inte din läkare sagt åt dig att göra det.
- Behandlingen fortsätter så länge du har nytta av den och så länge din läkare rekommenderar din behandling.
- Din läkare kan ändra din dos, göra ett tillfälligt uppehåll eller avsluta behandlingen med Alunbrig om du får biverkningar.
- Alunbrig kan tas med eller utan mat.
- Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tabletterna får inte krossas eller lösas upp.
- Kontakta din läkare eller sjuksköterska omgående **om du av misstag har tagit fler tabletter än rekommenderat.**



Undvik alla grapefruktprodukter under behandlingen eftersom dessa kan förändra mängden Alunbrig i kroppen.

Om du glömt att ta Alunbrig eller kräks direkt efter att du tagit din dos, ta inte en ytterligare tablett utan vänta och ta nästa dos av Alunbrig nästa dag.

För mer information läs noga bipacksedeln som medföljer läkemedlets förpackning.

Rekommenderad dosering ALUNBRIG

En tablett om dagen

VECKA 1
DAG 1-7

90 MG TABLETT
EN GÅNG OM DAGEN

DÄREFTER

VECKA 2
DAG 8 OCH
FRAMÅT

180 MG TABLETT
EN GÅNG OM DAGEN

ALUNBRIG kan tas med eller utan mat

Min ALUNBRIG-rutin

Att göra Alunbrig till en del av din dagliga rutin gör det lättare att komma ihåg att ta läkemedlet. Din läkare/sjuksköterska kan hjälpa dig med att avgöra vilken tidpunkt som skulle vara lämpligast för dig att ta Alunbrig.

Startförpackning

7 tabletter 90 mg – dag 1-7
21 tabletter 180 mg – från dag 8



180 mg

28 tabletter



90 mg

28 tabletter



30 mg

28 tabletter



Möjliga biverkningar med ALUNBRIG

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även Alunbrig, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du informerar din läkare eller sjuksköterska om du upplever att du får biverkningar av din behandling eftersom de kan hjälpa dig att hantera dem.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska omgående om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

Speciellt under första behandlingsveckan:

- En tidig biverkan kan vara **lung- eller andningssvårigheter** – ny eller förvärrad andningssvårighet, bröstsmärta, hosta eller feber.

Andra allvarliga biverkningar:

- **Högt blodtryck** – tala om för läkaren om du får huvudvärk, blir yr, får ont i bröstet eller blir andfådd.
- **Långsam puls** – tala om för din läkare om du får ont eller obehagskänsla i bröstet, förändrad puls (hjärtrytm), långsammare hjärtslag, känner dig yr eller om du svimmar.
- **Oförklarliga smärtor**, ömhet eller svaghet i musklerna.
- **Synproblem** – tala om för läkaren om du upplever synstörningar såsom ljusblixtar, dimsyn eller ljuskänslighet.
- **Högt blodsocker** – ökad törst, behov av att kissa ovanligt ofta.
- **Ont på höger sida av magen**, om din hud eller dina ögonvitor blir gulaktiga eller om urinen blir mörk.

Andra läkemedel

Alunbrig kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Alunbrig. Var noga med att tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar läkemedel mot eller för:

- Svampinfektioner (antimykotika)
- Bakterieinfektioner (antibiotika)
- Tuberkulos (TBC)
- Epilepsi
- Hjärtsjukdomar
- HIV och AIDS/virusinfektioner
- Gikt
- Blodproppar
- Narkolepsi
- Immunförsvaret
- Depression
- Kolesterol
- Inflammation (leder, tarm eller hud)
- Annan cancerform
- Naturläkemedel, t ex johannesört
- Smärta

Lista dina läkemedel

Gör gärna en lista på vilka läkemedel du tar som du kan visa för din läkare, sjuksköterska eller för apotekspersonalen.

Att tänka på

Graviditet

- Alunbrig **rekommenderas inte** under graviditet. Fertila kvinnor måste använda effektivt icke-hormonellt preventivmedel under behandlingen och 4 månader efter avslutad behandling.
- **Amma inte** under behandlingen med Alunbrig. Det är inte känt om brigatinib kan passera över i bröstmjölken och eventuellt skada barnet.
- **Män med fertila partners** som behandlas med Alunbrig bör använda effektivt preventivmedel under behandlingen och 3 månader efter avslutad Alunbrig behandling.

ALUNBRIG innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan start av behandling.

Överkänslighet mot solljus

Du kan bli extra känslig för solen då du behandlas med Alunbrig. Undvik längre stunder i solen, använd solskydd (SPF) minst 30 och skyddande klädsel.

Körförmåga och användning av maskiner

Alunbrig kan orsaka synstörningar, yrsel och trötthet. Kör inte fordon eller använd maskiner under din behandling om sådana symptom skulle uppstå.

Aktivitet och motion

Det är bra att röra på sig och aktivera sig så mycket man känner att man klarar av under behandlingen, t ex promenader.

Patientkort



Du kommer att få ett patientkort av din läkare eller sjuksköterska med säkerhetsinformation om din behandling. Vid kontakt med andra vårdgivare är det viktigt att du visar ditt patientkort. Förvara gärna kortet i plånboken så att du alltid har det tillhands.

Min dagbok →

Följande sidor är tänkt som ett stöd, en dagbok, där du kan skriva ner hur du mår och känner, om du har några frågor eller om du känt av några eventuella biverkningar. Kom ihåg att tala med din läkare/sjuksköterska om du känt av några biverkningar.

Dagboken kan användas som ett diskussionsunderlag när du träffar din läkare eller sjuksköterska. Om det uppstår frågor under behandlingens gång kan det vara bra att skriva ned dem så att du inte glömmer bort dem.

Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor.

Min dagbok

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Min dagbok

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Min dagbok

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Min dagbok

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Dagbok	Datum:
Hur mår jag?	
Hur har jag upplevt behandlingen?	
Är det något med behandlingen som jag tycker är svårt att förstå?	
Har jag några andra symtom? Andnings-svårigheter, besvär från magen, huvudvärk eller yrsel?	
Har jag ont/har smärtor? Var och hur ofta?	
Är det något som jag önskar att jag kunde göra, som jag inte kan nu?	
Övriga frågor till min läkare/sjuksköterska.	

Mina vårdkontakter

Min lungklinik/onkolog

Namn

Adress

Telefon

Min lungläkare/lungonkolog

Namn

Telefon

Min kontaktsjuksköterska

Namn

Telefon

Denna text är granskad av kontaktsjuksköterskor från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes universitetssjukhus i Lund, Universitetssjukhuset i Linköping, Sunderby sjukhus samt Hallands sjukhus i Halmstad.

Du kan också kontakta andra resurser

- **Lungcancerföreningen**, www.lungcancerforeningen.se
Lungcancerföreningen är en oberoende, ideell, förening för patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Råd och stödsamtal: 020-88 55 33
- Frågor om cancer; Kontakta **Cancerfonden** på infostodlinjen@cancerfonden.se
Eller ring: 020-59 59 59
- **Sjukvårdsupplysningen**, gå in på 1177.se eller ring 1177.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se, Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

Alunbrig® (brigatinib), 30 mg, 90 mg och 180 mg, filmdragerade tabletter.

Vad Alunbrig är och vad det används för: Alunbrig innehåller den aktiva substansen brigatinib som tillhör en klass av cancerläkemedel som kallas kinashämmare. Alunbrig används för att behandla vuxna i framskridet stadium av en form av lungcancer som kallas icke småcellig lungcancer. Det ges till patienter vars lungcancer beror på en onormal form av en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). **Ta inte Alunbrig:** om du är allergisk mot brigatinib eller något annat av innehållsämnen.

Varningar och försiktighet: Tala med läkaren innan du tar Alunbrig eller under behandlingen om du har problem med lungorna eller andningen (lungproblem, ibland allvarliga, är vanligare under de första 7 behandlings-dagarna, symtomen kan likna dem på lungcancer, informera läkaren om alla nya eller förvärrade symtom såsom andningsproblem, andfåddhet, bröstsmärta, hosta eller feber), högt blodtryck, långsam puls (bradykardi), synstörning (informera läkare om alla synstörningar som inträffar under behandlingen såsom ljusblixtar, dimsyn eller ljuskänslighet), muskelproblem (rapportera alla oförklarliga smärtor, ömhet eller svaghet i musklerna till läkaren), problem med bukspottkörteln, problem med levern, högt blodsocker, överkänslighet mot solljus (undvik längre stunder i solen under behandlingen och under minst 5 dagar efter den sista dosen samt använd hatt, skyddande klädsel, solskyddsmedel och läppbalsam med en solskyddsfaktor (SPF) på minst 30). Alunbrig rekommenderas inte under graviditet eller amning. Män och kvinnor som behandlas med Alunbrig ska inte skaffa barn under behandlingen och ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i 3 månader efter behandlingens slut. Alunbrig kan orsaka synstörningar, yrsel och trötthet - kör inte något fordon och använd inte maskiner under behandlingen om du får sådana symtom.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda Alunbrig.

Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 01/2022.

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se

C-APROM/SE/ALUN/0053 OKT -22



Takeda Pharma AB

Tel: 08-731 28 00, www.takeda.se



ALUNBRIG[®]
BRIGATINIB

För mer information läs noga bipacksedeln som medföljer läkemedlets förpackning.