



BEHANDLING MED TAKHZYRO (lanadelumab) FÖRFYLLD SPRUTA

Du har fått den här broschyren eftersom du eller någon som du hjälper, har fått TAKHZYRO förskrivet.

TAKHZYRO är ett läkemedel som används för att förhindra angioödemfall hos vuxna och barn i åldern 2 år och äldre, med hereditärt angioödem (HAE).

Broschyren delas ut av sjukvårdspersonal. Läs bipacksedeln noga.



TAKHZYRO®
lanadelumab subkutan injektion



HEREDITÄRT ANGIOÖDEM (HAE)

HAE är en ärftlig och ovanlig sjukdom. Vanligen beror sjukdomen på att det inte finns tillräckligt av proteinet C1-hämmare i blodet, eller att C1-hämmaren inte fungerar som den ska.

Detta leder till för mycket plasmakallikrein i blodet, vilket i sin tur ger höga nivåer av bradykinin; ett ämne som orsakar symtom på HAE som till exempel svullnad och smärta i:

- händer och fötter
- magen
- ansikte, ögonlock, läppar eller tunga
- struphuvudet (larynx), vilket kan göra det svårt att andas
- könsorganen

VAD ÄR TAKHZYRO?

TAKHZYRO är ett läkemedel som används för att förhindra angioödemfall hos vuxna och barn i åldern 2 år och äldre, med hereditärt angioödem (HAE).


TAKHZYRO innehåller den aktiva substansen lanadelumab.

HUR FUNGERAR TAKHZYRO?

TAKHZYRO är ett protein som blockerar aktiviteten hos plasmakallikrein. Detta hjälper till att minska mängden av bradykinin i blodet och förebygger symtom på HAE.

När man har HAE är plasmakallikreinaktiviteten förhöjd:

- Plasmakallikreinaktiviteten är alltid "på" som en fullt öppen kran
- Detta gör att mycket bradykinin frisätts; ett ämne som ger symtom på HAE såsom svullnad och smärta
- TAKHZYRO blockerar aktiviteten hos plasmakallikrein och skruvar åt kranen
- Detta hjälper till att minska mängden av bradykinin som frisätts i blodet och förebygger HAE-symtom



HUR SKA TAKHZYRO ANVÄNDAS?

TAKHZYRO förfylld spruta är färdig att använda och innehåller en fast dos. Varje spruta ska bara användas en gång.

Din behandling startas upp och leds av en läkare som har erfarenhet av att behandla patienter med HAE. TAKHZYRO finns i två olika styrkor. Din läkare avgör vilken dos du ska ha, och hur ofta TAKHZYRO ska injiceras – följ alltid din läkares ordination.

Injektionen kan ges av dig själv, någon som hjälper dig eller av din vårdgivare. Innan du använder TAKHZYRO förfylld spruta för första gången ska en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska visa dig hur du förbereder och injicerar TAKHZYRO på rätt sätt.

Använd alltid TAKHZYRO enligt instruktionerna i bipacksedeln eller som din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska har sagt. Fråga någon av personerna ovan om du är osäker eller har frågor.



SÅ INJICERAS TAKHZYRO

Om du injicerar TAKHZYRO själv eller om din vårdgivare gör det, ska ni läsa och följa instruktionerna i avsnitt 7 "Bruksanvisning" i bipacksedeln.

1. Förbered injektionen

Ta fram TAKHZYRO förfylld spruta och tillbehören som behövs (spritservett, bomullstuss/gasvävskompress, plåster och en behållare för vasst avfall). Låt sprutan ligga framme i 15 till 30 minuter så att den uppnår rumstemperatur. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem ordentligt. Kontrollera att den förfyllda sprutan inte har några skador och att läkemedlet är färglöst till svagt gult.

2. Rengör injektionsstället

TAKHZYRO ska injiceras i magen (buken), låret eller baksidan av överarmen. Om du injicerar på baksidan av överarmen behöver du ha hjälp. Rengör injektionsstället med en spritservett och låt huden torka. Dra av nålskyddet från sprutan och släng det.

3. Injicera TAKHZYRO

Injicera TAKHZYRO långsamt, tills sprutan är tom. Om det behövs kan du trycka bomullstussen eller gasvävskompressen över injektionsstället och hålla kvar i 10 sekunder. När du är klar slänger du den tomma sprutan i behållaren för vasst avfall.

TIPS:

Använd olika injektionsställen för att hålla huden frisk. Du kan till exempel variera mellan olika ställen på magen om du helst injicerar där.



Se bipacksedeln för fullständiga instruktioner.

KAN JAG TA ANDRA LÄKEMEDEL SAMTIDIGT SOM TAKHZYRO?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel, eller har gjort det nyligen.

TAKHZYRO har ingen känd påverkan på andra läkemedel eller påverkas av andra läkemedel.

VAD GÄLLER VID GRAVIDITET OCH AMNING?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda TAKHZYRO. För säkerhets skull rekommenderas att man undviker att använda TAKHZYRO om man är gravid eller ammar eftersom man ännu inte vet tillräckligt mycket om säkerheten i de här situationerna. Du och din läkare kommer att diskutera riskerna och fördelarna med att ta TAKHZYRO.

KAN JAG KÖRA BIL ELLER ANVÄNDA MASKINER?

TAKHZYRO har försumbar effekt på förmågan att köra bil eller andra fordon och på att använda maskiner.



OM DU HAR ANVÄNT FÖR MYCKET TAKHZYRO

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har använt för stor mängd av TAKHZYRO.

OM DU HAR GLÖMT ATT TA TAKHZYRO

Om du missar en dos av TAKHZYRO ska du ta den så snart som möjligt, men det måste gå minst 10 dagar mellan varje injektion om du injicerar varannan vecka. Det måste gå minst 17 dagar mellan doserna om du injicerar var tredje vecka och minst 24 dagar mellan doserna om du injicerar var fjärde vecka. Om du är osäker på när du ska ta TAKHZYRO efter en missad dos ska du fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

OM DU SLUTAR MED TAKHZYRO

Det är viktigt att du fortsätter att ta TAKHZYRO enligt din läkares instruktioner, även om du känner dig bättre.

Om du har frågor kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

VILKA BIVERKNINGAR KAN MAN FÅ?

De vanligaste biverkningarna med TAKHZYRO är reaktioner vid injektionsstället, till exempel smärta, hudrodnad, blåmärke, obehag, svullnad, blödning, klåda, förhårdnad i huden, stickningar, värmekänsla och utslag.

Andra vanliga biverkningar:

- Allergiska reaktioner med t.ex. klåda, obehag och stickningar i tungan
- Yrsel, svimningskänsla
- Upphöjda hudutslag
- Muskelsmärta
- Blodprover som visar på förändringar i levern



Om du får biverkningar ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att få fram mer information om säkerheten med detta läkemedel.

Detta läkemedel kan liksom alla andra läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

*Om du får en allvarlig allergisk reaktion av TAKHZYRO med symtom som utslag, åtstramning i bröstet, väsande andning eller snabba hjärtslag, ska du **omedelbart** tala om det för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.*

TAKHZYRO INSTRUKTIONSFILM

På medicininstruktioner.se finns en film som visar hur du använder TAKHZYRO.



Skanna QR-koden

HÅLL KOLL PÅ DIN BEHANDLING

Medicinen bryts ner i kroppen allteftersom och därför behöver du ta TAKHZYRO regelbundet. Det är viktigt att du fortsätter att ta TAKHZYRO enligt din läkares instruktioner, även om du känner dig bättre. Om du hoppar över en dos eller låter det gå längre tid mellan varje dos kan detta leda till genombrottsanfall.

TIPS:

- Ta TAKHZYRO på samma dag som du har en aktivitet vid en viss tid. Det kan hjälpa dig att komma ihåg att det är dags att injicera
- Markera i kalendern eller ställ in en påminnelse i mobilen om nästa injektion
- Be en vän eller någon i familjen att hjälpa till genom att stämma av och påminna dig



Skriv ner datum och tillverknings-satsnummer (batchnummer) varje gång du tar TAKHZYRO.

Det är viktigt att du alltid har din akutmedicin till hands, även om du känner dig bättre.

Kontrollera utgångsdatumet på dina mediciner, så att de inte har gått ut.

TAKHZYRO PÅ RESAN

Vad händer om du ska resa och behöver ta TAKHZYRO?
Så här kan du planera i förväg:

- Förvara TAKHZYRO i kylskåp (2–8 °C) tills det ska användas. Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen för att skydda från ljus. TAKHZYRO förfyllda sprutor kan förvaras i upp till 25 °C i 14 dagar, men inte efter utgångsdatumet. Sprutor som förvarats i rumstemperatur ska inte läggas tillbaka i kylskåpet. TAKHZYRO får inte frysas eller skakas.
- Kolla upp vad som gäller i det land du ska resa till/från, om det finns några särskilda regler för att ta med medicin genom säkerhetskontrollen eller tullen.



HA KOLL MED TAKHZYRO



**FÅ TRÄNING
I HUR MAN
INJICERAR
FÖRE FÖRSTA DOSEN**



**MARKERA I
KALENDERN
ELLER STÄLL IN EN
PÅMINNELSE I MOBILEN
OM NÄSTA INJEKTION**



**FORTSÄTT ATT
TA TAKHZYRO
ÄVEN OM DU INTE HAR
FÅTT NÅGON ATTACK
PÅ LÄNGE**

TAKHZYRO (lanadelumab) 150 och 300 mg, injektionsvätska, lösning och lösning i förfylld spruta. **Vad TAKHZYRO är och vad det används för:** TAKHZYRO är ett receptbelagt läkemedel som används till patienter 2 år och äldre för att förhindra angioödemanfäll hos patienter med hereditärt (ärfligt) angioödem. **Använd inte TAKHZYRO:** om du är allergisk mot lanadelumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. **Varningar och försiktighet:** Injicera inte dig själv eller någon annan förrän du har utbildats i att injicera läkemedlet. Om du injiceras TAKHZYRO själv eller om din vårdare injiceras läkemedlet måste du eller din vårdare noggrant läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln avsnitt 7, "Bruksanvisning". Det rekommenderas starkt att du skriver ned läkemedlets namn och tillverkningsnummer varje gång du tar en dos av TAKHZYRO. På så sätt kan du hålla reda på vilka tillverkningssatser som använts. Om du får en allvarlig allergisk reaktion mot TAKHZYRO med symtom som utslag, åstämning i bröstet, väsande andning eller snabba hjärtslag, ska du **omedelbart** tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. TAKHZYRO är inte avsett för behandling av akuta HAE-anfall. Dessa ska behandlas med akutläkemedel. Rådfråga läkare innan du använder TAKHZYRO om du är eller tror att du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda TAKHZYRO.

Förkortad information baserad på bipacksedeln daterad 11/2023.

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se



Takeda Pharma AB
08-731 28 00
infosweden@takeda.com
www.takeda.se