



Bild på injektionspennan endast för illustration.

TAKHZYRO®
lanadelumab subkutan injektion

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Steg för steg – så här använder du TAKHZYRO förfylld injektionspenna



Du har fått den här broschyren eftersom du, eller någon som du hjälper, har fått TAKHZYRO förskrivet.

TAKHZYRO är ett läkemedel som används för att förhindra angioödemfall hos vuxna och barn i åldern 2 år och äldre, med ärftligt angioödem (HAE).^{*} Broschyren delas ut av sjukvårdspersonal. Läs bipacksedeln noga.

^{*} Den förfyllda injektionspennan ska inte användas till barn yngre än 12 år då den inte har studerats i denna åldersgrupp.

TAKHZYRO INSTRUKTIONSFILM

På medicininstruktioner.se finns en film som visar hur du använder TAKHZYRO.




Skanna QR-koden

DEN FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN ÄR FÄRDIG ATT ANVÄNDA

TAKHZYRO förfylld injektionspenna är ett bruksfärdigt läkemedel och ges som en injektion under huden. Din läkare avgör hur ofta du ska ta TAKHZYRO – följ alltid läkarens anvisningar. Injektionen kan ges av dig själv eller av någon som hjälper dig. Innan du använder TAKHZYRO för första gången ska läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal visa dig hur du förbereder och ger injektionen på rätt sätt.


Den förfyllda injektionspennans delar



Du behöver även:



Spritservetter



Bomullstuss/
gasvävskompress



Plåster




Behållare för
vasst avfall

Viktigt

Förvara alltid behållaren för vasst avfall utom räckhåll för barn.


FÖRBERED INJEKTIONEN

1. Ta fram en spritservett, bomullstuss/gasvävskompress, plåster och en behållare för vasst avfall och lägg dem på en ren, jämn arbetsyta som är väl upplyst. Dessa tillbehör ingår inte i TAKHZYRO-förpackningen.
2. Ta ut förpackningen från kylskåpet, öppna kartongen och ta fram den förfyllda injektionspennan med TAKHZYRO från brickan.
 - Det rekommenderas starkt att du skriver ned läkemedlets namn och tillverknings-satsnummer varje gång du tar en dos av TAKHZYRO.
 - **Låt injektionspennan ligga framme i 30 minuter så att den uppnår rumstemperatur.**
 - Läkemedlet är känsligt för höga temperaturer. Använd **inte** värmekällor som mikrovågsugn eller varmvatten för att värma den förfyllda injektionspennan.
 - Ta **inte** bort skyddslocket och rör eller tryck inte på nålskyddet förrän du är redo att injicera.
3. Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka händerna ordentligt.



4. Kontrollera utgångsdatumet på etiketten.

- Använd **inte** den förfyllda injektionspennan med TAKHZYRO om utgångsdatumet har passerat.



5. Kontrollera att den förfyllda injektionspennan inte har några skador och att läkemedlet är färglöst till svagt gult.

- Använd **inte** produkten om injektionspennan är skadad, till exempel om den har spruckit.
- Administrera **inte** läkemedlet om det är missfärgat, grumligt, har flakor eller innehåller partiklar. Kontakta i så fall din vårdgivare.
- Det kan finnas luftbubblor i visningsfönstret på den förfyllda injektionspennan. Detta är normalt och påverkar inte dosen.


Förvaring av TAKHZYRO förfylld injektionspenna

- Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
- En förfylld injektionspenna som tagits ut ur kylskåpet ska förvaras vid en temperatur lägre än 25 °C och användas inom 14 dagar. Efter förvaring i rumstemperatur ska injektionspennan inte läggas tillbaka i kylskåpet.
- Förvara TAKHZYRO i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
- Skaka **inte** TAKHZYRO.
- **Förvara TAKHZYRO och alla läkemedel utom räckhåll för barn.**

VÄLJ OCH RENGÖR INJEKTIONSSTÄLLET

1. Välj ett injektionsställe på magen (buken), låret eller överarmen. Om du vill injicera i överarmen måste du ha hjälp.

- Det är viktigt att använda olika injektionsställen för att hålla huden frisk. Varje ny injektion ska ges minst 2,5 cm från det senaste injektionsstället.
- Injicera **inte** i ett område på kroppen där huden är irriterad, röd, har blåmärken eller är infekterad.
- Injektionsområdet du väljer ska ha ett avstånd på minst 5 cm från ärr eller naveln.




2. Rengör injektionsstället med en spritservett och låt huden torka.

- Fläkta eller blås **inte** på det rena området.
- Rör **inte** vid detta område igen förrän du ger injektionen.




3. Håll ett stadigt grepp på mitten av den förfyllda injektionspennan med den ena handen och dra skyddslocket rakt ut med den andra handen.

- Nålen skyddas av nålskyddet.
- Du kanske ser att några vätskedroppar kommer ut ur nålen. Det är normalt och påverkar inte dosen.
- Den förfyllda injektionspennan är klar för injektion när skyddslocket tagits bort.
- Vidrör eller tryck **inte** på nålskyddet förrän du är redo att injicera.
- Sätt **inte** tillbaka skyddslocket, utan kassera det i soporna eller i en behållare för vasst avfall.



INJICERA TAKHZYRO

1. Håll den förfyllda injektionspennan i en hand så att du kan se visningsfönstret medan du ger injektionen.
 - Tryck **inte** nålskyddet mot huden förrän du är redo att ge injektionen.
2. Nyp försiktigt ihop cirka 2,5 cm av den rengjorda huden med den andra handen.
 - Fortsätt nypa huden tills injektionen är klar och nålen dragits bort.
3. Placera den förfyllda injektionspennan på huden i 90 graders vinkel mot det valda injektionsstället.
 - Tryck **inte** ned injektionspennan förrän du är redo att injicera.
 - Kontrollera att du kan se visningsfönstret.
4. Tryck stadigt injektionspennan rakt nedåt och håll kvar. Då förs nålen in och injektionen startar.
5. Injektionen kan ta upp till 25 sekunder.
 - När injektionen startar hör du ett "klick"-ljud.
 - Det kommer ett andra "klick" – detta är **inte** slutet av injektionen.
 - Fortsätt att hålla ned med konstant tryck tills **visningsfönstret har blivit helt rosa.**
 - **Innan du tar bort injektionspennan från huden ska du kontrollera att visningsfönstret har blivit helt rosa.** Det betyder att du har fått hela dosen.
 - Den grå kolven är fortfarande synlig i visningsfönstret när injektionen är klar. Det är normalt och påverkar inte dosen.
 - Om visningsfönstret inte blev helt rosa ska du kontakta sjukvårdspersonal.
6. Lyft sakta bort injektionspennan rakt från injektionsstället. Nålskyddet ska täcka hela nålen. Släpp därefter huden.
 - Du kan få en mindre blödning. Det är normalt. Tryck en bomullstuss eller gasvävskompress mot injektionsstället – gnugga **inte**.
 - Sätt på ett plåster om det behövs.
7. Varje förfylld injektionspenna ska endast användas en gång. Kassera den använda injektionspennan i behållaren för vasst avfall direkt efter användning.



TAKHZYRO (lanadelumab) 150 och 300 mg, injektionsvätska, lösning, lösning i förfylld spruta och lösning i förfylld injektionsspenna. **Vad TAKHZYRO är och vad det används för:** TAKHZYRO är ett receptbelagt läkemedel som används till patienter 2 år och äldre för att förhindra angioödemfall hos patienter med arvet (ärfvligt) angioödem. **Använd inte TAKHZYRO:** om du är allergisk mot lanadelumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. **Varningar och försiktighet:** TAKHZYRO får endast administreras av vuxna och ungdomar över 12 år efter utbildning i subkutan injektionsteknik under ledning av sjukvårdspersonal. Den förfyllda injektionsspennan har inte studerats hos barn i åldern 2 till < 12 och ska därför inte användas. Injicera inte dig själv eller någon annan förrän du har utbildats i att injicera läkemedlet. Om du injicerar TAKHZYRO själv eller om din vårdare injicerar läkemedlet måste du eller din vårdare noggrant läsa och följa instruktionerna i bipacksedeln avsnitt 7, "Bruksanvisning". Det rekommenderas starkt att du skriver ned läkemedlets namn och tillverkningsnummer varje gång du tar en dos av TAKHZYRO. På så sätt kan du hålla reda på vilka tillverkningsnummer som använts. Om du får en allvarlig allergisk reaktion mot TAKHZYRO med symtom som utslag, åstämning i bröstet, väsande andning eller snabba hjärtslag, ska du **omedelbart** tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. TAKHZYRO är inte avsett för behandling av akuta HAE-anfall. Dessa ska behandlas med akutläkemedel. Rådfråga läkare innan du använder TAKHZYRO om du är gravid eller ammar eller om du tror att du är gravid. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda TAKHZYRO.** Förkortad information baserad på bipacksedeln daterad 02/2025. **Kontakt:** Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com.

Använd alltid TAKHZYRO förfylld injektionsspenna exakt enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker eller har frågor.



Takeda Pharma AB
08-731 28 00
infosweden@takeda.com

C-ANPROM/SE/TAKH/0035 09/2025

TAKHZYRO[®]
lanadelumab subkutan injektion